

■ レジメン名	: ザノサー (5日間連続) 療法
対象疾患	: 膵・NET
1cycle (期間)	: 42日間
薬剤	: ストレプトゾシン 500mg/m <sup>2</sup> lay1, 2, 3, 4, 点滴静注 60分
■ レジメン名	: 5-FU+RT①~ 膵
対象疾患	: 膵癌
1cycle (期間)	: 39日間
薬剤	: フルオロウラシル 200mg/m <sup>2</sup> day1-38 点滴静注 1440分
■ レジメン名	: FOLFIRINOX 膵
対象疾患	: 膵癌
1cycle (期間)	: 14日間
薬剤	: オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup> day1 点滴静注 120分
	: レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 点滴静注 120分
	: イリノテカン 180mg/m <sup>2</sup> day1 点滴静注 90分
	: フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 点滴静注 全開
	: フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1-3 持続静注 24時間
■ レジメン名	: 後発CDDP+後発GEM①② 膵・胆
対象疾患	: 胆どう癌
1cycle (期間)	: 21日
薬剤	: シスプラチン 25mg/m <sup>2</sup> day1, 8 点滴静注 60分
	: ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup> day1, 8 点滴静注 30分
■ レジメン名	: 後発GEM ①② 膵胆
対象疾患	: 膵癌
1cycle (期間)	: 21日
薬剤	: ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup> day1, 8 点滴静注 30分
■ レジメン名	: 後発GEM+アブラキサン ①② 膵
対象疾患	: 膵癌
1cycle (期間)	: 21日
薬剤	: アブラキサン 125mg/m <sup>2</sup> day1, 8 点滴静注 30分
	: ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup> day1, 8 点滴静注 30分
■ レジメン名	: 後発GEM+アブラキサン ①②③ 膵
対象疾患	: 膵癌
1cycle (期間)	: 28日
薬剤	: アブラキサン 125mg/m <sup>2</sup> day1, 8, 15 点滴静注 30分
	: ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup> day1, 8, 15 点滴静注 30分
■ レジメン名	: 後発GEM①②③ 膵胆
対象疾患	: 膵癌
1cycle (期間)	: 28日
薬剤	: ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup> day1, 8, 15 点滴静注 30分
■ レジメン名	: CDDP+VP-16 膵・消化管Net
対象疾患	: 膵NET
1cycle (期間)	: 21日
薬剤	: シスプラチン 80mg/m <sup>2</sup> day1 点滴静注 120分
	: エトポシド 100mg/m <sup>2</sup> day1, 2, 3 点滴静注 120分
■ レジメン名	: FOLFIRINOX 膵
対象疾患	: 膵癌
1cycle (期間)	: 14日間
薬剤	: オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup> day1 点滴静注 120分
	: レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 点滴静注 120分
	: イリノテカン 180mg/m <sup>2</sup> day1 点滴静注 90分
	: フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 点滴静注 全開
	: フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1-3 持続静注 24時間
■ レジメン名	: 後発CDDP+後発GEM①② 膵・胆
対象疾患	: 胆どう癌
1cycle (期間)	: 21日
薬剤	: シスプラチン 25mg/m <sup>2</sup> day1, 8 点滴静注 60分
	: ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup> day1, 8 点滴静注 30分
■ レジメン名	: 後発GEM+アブラキサン ①② 膵
対象疾患	: 膵癌
1cycle (期間)	: 21日
薬剤	: アブラキサン 125mg/m <sup>2</sup> day1, 8 点滴静注 30分
	: ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup> day1, 8 点滴静注 30分

■ レジメン名 : 後発GEM+アブラキサン ①②③ 膾  
対象疾患 : 膾癌  
1cycle (期間) : 28日  
薬剤 : アブラキサン 125mg/m<sup>2</sup> day1, 8, 15 点滴静注 30分  
ゲムシタビン 1000mg/m<sup>2</sup> day1, 8, 15 点滴静注 30分

---

■ レジメン名 : 後発GEM①②+TS-1 膾胆  
対象疾患 : 胆どう癌  
1cycle (期間) : 21日  
薬剤 : S-1 80mg/m<sup>2</sup>/day day1-14 経口 1日2回  
ゲムシタビン 1000mg/m<sup>2</sup> day1, 8 点滴静注 30分

---

■ レジメン名 : 後発GEM①②③ 膾胆  
対象疾患 : 膾癌  
1cycle (期間) : 28日  
薬剤 : ゲムシタビン 1000mg/m<sup>2</sup> day1, 8, 15 点滴静注 30分

---

■ レジメン名 : NaI-IRI+I-LV/5-FU療法  
対象疾患 : 膾癌  
1cycle (期間) : 14日  
薬剤 : オニバイド 70mg/m<sup>2</sup> day1 点滴静注 90分  
レボホリナート 200mg/m<sup>2</sup> day1 点滴静注 120分  
フルオロウラシル 2400mg/m<sup>2</sup> day1 点滴静注 46時間

---