

| | | |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|
| レジメン名 | : アザシチジン単独療法①～⑤ | 点滴静注 |
| 対象疾患 | : 骨髄性異形成症候群 | |
| 1cycle (期間) | : 28日 | |
| 薬剤 | : アザシチジン | 75mg/m ² day1-5 点滴静注 10分 |
| レジメン名 | : アザシチジン単独療法①～⑦ | 点滴静注 |
| 対象疾患 | : 骨髄性異形成症候群 | |
| 1cycle (期間) | : 28日 | |
| 薬剤 | : アザシチジン | 75mg/m ² day1-7 点滴静注 10分 |
| ■ レジメン名 | : アザシチジン単独療法①～⑤ | 皮下注 |
| 対象疾患 | : 骨髄性異形成症候群 | |
| 1cycle (期間) | : 28日 | |
| 薬剤 | : アザシチジン | 75mg/m ² day1-5 点滴静注 10分 |
| ■ レジメン名 | : アザシチジン単独療法①～⑦ | 皮下注 |
| 対象疾患 | : 骨髄性異形成症候群 | |
| 1cycle (期間) | : 28日 | |
| 薬剤 | : アザシチジン | 75mg/m ² day1,7 点滴静注 10分 |