■ レジメン名　：　G-アラカルチニブ療法　②コース目（CLL）
対象疾患　：　慢性リンパ性白血病
1cycle（期間）　：　28日
薬剤　：　ガザイバ　100mg　day1　点滴静注　4時間以上(25ｍｇ/hr)
ガザイバ　900mg　day2　点滴静注　4時間以上
１）前回の投与でinfusin reactionが発現しなかった場合
50ｍｇ/ｈｒで投与を開始し、30分毎に50ｍｇ/ｈｒずつ最大400ｍｇ/ｈｒまで上げることができる
２）前回の投与でin reactionが発現した場合
25ｍｇ/ｈｒで投与を開始し、30分毎に50ｍｇ/ｈｒずつ最大400ｍｇ/ｈｒまで上げることができる
ガザイバ　1000mg　day8、15　点滴静注　３時間15分以上
１）前回の投与でinfusin reactionが発現せず、最終的な投与速度が100ｍｇ/ｈｒ以上の場合
100ｍｇ/ｈｒで投与を開始し、30分毎に100ｍｇ/ｈｒずつ最大400ｍｇ/時まで上げることができる
２）infusin rea in reactionが発現した場合
50ｍｇ/ｈｒで投与を開始し、30分毎に50ｍｇ/ｈｒずつ最大400ｍｇ/時まで上げることができる

■ レジメン名　：　G-アラカルチニブ療法　③～⑦コース目（CLL）
対象疾患　：　慢性リンパ性白血病
1cycle（期間）　：　28日
薬剤　：　ガザイバ　1000mg　day1　点滴静注　３時間15分以上
１）前回の投与でinfusin reactionが発現せず、最終的な投与速度が100ｍｇ/ｈｒ以上の場合
100ｍｇ/ｈｒで投与を開始し、30分毎に100ｍｇ/ｈｒずつ最大400ｍｇ/時まで上げることができる
２）infusin rea in reactionが発現した場合
50ｍｇ/ｈｒで投与を開始し、30分毎に50ｍｇ/ｈｒずつ最大400ｍｇ/時まで上げることができる