■ レジメン名 ： ペルツズマブ＋トラスツズマブ＋ドセタキセル療法(例)
対象疾患 ： 乳癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
ペルツズマブ	420mg/body （初回：840mg/body）	day1	点滴静注	30分 （60分）
トラスツズマブ	6mg/kg （初回：8mg/kg）	day1	点滴静注	30分 （90分）
ドセタキセル	70mg/m^2	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 ： AC療法(例)
対象疾患 ： 乳癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
ドキソルビシン	60mg/m^2	day1	点滴静注	全開
シクロホスファミド	600mg/m^2	day1	点滴静注	20分

■ レジメン名 ： エリブリン療法①② （例）
対象疾患 ： 乳癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
エリブリン	1.4mg/m2	day1,8	点滴静注	全開

■ レジメン名 ： CDDP+TS-1療法(例)
対象疾患 ： 胃癌
1cycle（期間） ： 35日

薬剤				
S-1	80mg/m^2/day	day1-21	経口	1日2回
シスプラチン	60mg/m^2	day8	点滴静注	120分

■ レジメン名 ： CAPOX療法　胃癌(例)
対象疾患 ： 胃癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
カペシタビン	1000mg/m^2/回	day1-14	経口	1日2回
オキサリプラチン	130mg/m^2	day1	点滴静注	120分

■ レジメン名 ： CDDP+5-FU①～⑤　食道
対象疾患 ： 食道癌
1cycle（期間） ： 28日

薬剤				
シスプラチン	80mg/m^2	day1	点滴静注	120分
フルオロウラシル	4000mg/m^2	day1	点滴静注	5日間

■ レジメン名 ： CDDP+5-FU①～⑤(術前)　食道
対象疾患 ： 食道癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
シスプラチン	80mg/m^2	day1	点滴静注	120分
フルオロウラシル	4000mg/m^2	day1	点滴静注	5日間

■ レジメン名 ： ドセタキセル①　食道
対象疾患 ： 食道癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
ドセタキセル	70mg/m^2	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 ： 初回ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙweekly①②③④⑤⑥　食道
対象疾患 ： 食道癌
1cycle（期間） ： 49日

薬剤				
パクリタキセル	100mg/m^2	day1,8,15,22,29,36	点滴静注	60分

■ レジメン名 ： ニボルマブ療法
対象疾患 ： 食道癌
1cycle（期間） ： 14日

薬剤				
オプジーボ	240mg	day1	点滴静注	30分

■ レジメン名 ： ドセタキセル＋アクプラ①　食道
対象疾患 ： 食道癌
1cycle（期間） ： 14日

薬剤				
アクプラ	40mg/m^2	day1	点滴静注	120分
ドセタキセル	30mg/m^2	day1	点滴静注	90分

■ レジメン名 ： DCF療法(術前3コース)　食道
対象疾患 ： 食道癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
ドセタキセル	70mg/m^2	day1	点滴静注	60分
シスプラチン	70mg/m^2	day1	点滴静注	120分
フルオロウラシル	3,750mg/m2	day1	点滴静注	5日間

■ レジメン名 ： Tislelizumab療法　食道
対象疾患 ： 食道癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
テビムブラ	200mg	day1	点滴静注 初回	30分 60分

■ レジメン名 ： Tislelizumab＋FP療法　食道
対象疾患 ： 食道癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
テビムブラ	200mg	day1	点滴静注 初回	30分 60分
シスプラチン	80mg/m^2	day1	点滴静注	120分
フルオロウラシル	4000mg/m^2	day1	点滴静注	5日間

■ レジメン名 ： Nivolumab療法(4週毎)　食道
対象疾患 ： 食道癌
1cycle（期間） ： 28日

薬剤				
オプジーボ	480mg	day1	点滴静注	30分

■ レジメン名 ： Nivolumab＋Ipilimumab療法　食道

対象疾患	:	食道癌				
1cycle（期間）	:	42日				
薬剤	:	オプジーボ	360mg	day1,22	点滴静注	30分
		ヤーボイ	1(mg/kg)	day1	点滴静注	30分

■ レジメン名	:	Nivolumab＋FP療法　食道				
対象疾患	:	食道癌				
1cycle（期間）	:	28日				
薬剤	:	オプジーボ	480mg	day1	点滴静注	30分
		シスプラチン	80mg/m^2	day1	点滴静注	120分
		フルオロウラシル	4000mg/m^2	day1	点滴静注	5日間

■ レジメン名	:	Pembrolizumab＋FP療法　食道				
対象疾患	:	食道癌				
1cycle（期間）	:	21日				
薬剤	:	キイトルーダ	200mg	day1	点滴静注	30分
		シスプラチン	80mg/m^2	day1	点滴静注	120分
		フルオロウラシル	4000mg/m^2	day1	点滴静注	5日間