■ レジメン名 : 5-FU+MMC±RT 肛門管
対象疾患 : 大腸癌
1cycle（期間） : 28日

薬剤				
フルオロウラシル	1000mg/㎡/day	day1-4	点滴静注	24時間
マイトマイシン	10mg/㎡	day1	点滴静注	10分

■ レジメン名 : FOLFIRI療法
対象疾患 : 大腸癌
1cycle（期間） : 14日

薬剤				
レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	120分
イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分
フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	13分
フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2	点滴静注	45時間

■ レジメン名 : mFOLFOX6 大腸
対象疾患 : 大腸癌
1cycle（期間） : 14日

薬剤				
レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	120分
オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	120分
フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	13分
フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2	点滴静注	45時間

■ レジメン名 : ベクティビックス＋CAPOX① 大腸（Apr併用）
対象疾患 : 大腸癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤				
カペシタビン	2000mg/㎡/day	day1～14	経口	1日2回
パニツムマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	60分
オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	120分

■ レジメン名 : ベクティビックス+FOLFIRI 大腸 （後発CPT-11）
対象疾患 : 大腸癌
1cycle（期間） : 14日

薬剤				
パニツムマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	60分
レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	120分
イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分
フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	13分
フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2	点滴静注	45時間

■ レジメン名 : ベクティビックス+mFOLFOX6 大腸
対象疾患 : 大腸癌
1cycle（期間） : 14日

薬剤				
パニツムマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	60分
レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	120分
オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	120分
フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	13分
フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2	点滴静注	45時間

■ レジメン名 : ラムシルマブ＋FOLFIRI 大腸
対象疾患 : 大腸癌
1cycle（期間） : 14日

薬剤				
ラムシルマブ	8mg/kg	day1	点滴静注	60分
レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	120分
イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分
フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	10分
フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2	点滴静注	45時間

■ レジメン名 : CAPIRI 大腸
対象疾患 : 大腸癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤				
カペシタビン	1600mg/㎡/day	day1～14	経口	1日2回
イリノテカン	200mg/㎡	day1	点滴静注	90分

■ レジメン名 : CAPOX 大腸（Apr併用）
対象疾患 : 大腸癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤				
カペシタビン	2000mg/㎡/day	day1～14	経口	1日2回
オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	120分

■ レジメン名 : FOLFOXIRI療法 大腸
対象疾患 : 大腸癌
1cycle（期間） : 14日

薬剤				
レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	120分
イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	60分
オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	120分
フルオロウラシル	3000mg/㎡	day1～2	点滴静注	45時間

■ レジメン名 : IRI＋ベクティビックス 大腸
対象疾患 : 大腸癌
1cycle（期間） : 14日

薬剤				
パニツムマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	60分
イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分

■ レジメン名 : IRIS（S-1+IRI)③週 大腸
対象疾患 : 大腸癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤				
S-1	1.25㎡未満：40mg/回 1.25～1.5㎡：50mg/回 1.5㎡以上：60mg/回	day1-14	経口	1日2回
イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分

■ レジメン名 : IRIS（S-1+後発CPT-11） 大腸
対象疾患 : 大腸癌
1cycle（期間） : 28日

薬剤				
S-1	1.25㎡未満：40mg/回 1.25～1.5㎡：50mg/回 1.5㎡以上：60mg/回	day1-14	経口	1日2回
イリノテカン	125mg/㎡	day1.15	点滴静注	90分

■ レジメン名 : SOX（TS-1＋L-OHP） 大腸（Apr併用）
対象疾患 : 大腸癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤				
S-1	1.25㎡未満：40mg/回 1.25～1.5㎡：50mg/回	day1-14	経口	1日2回

		1.5㎡以上：60mg/回			
	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	120分
■ レジメン名	： ペクティビックス単独療法				
対象疾患	： 大腸癌				
1cycle（期間）	： 14日				
薬剤	： パニツムマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	60分
■ レジメン名	： ペムブロリズマブ療法　大腸（MSI-High）				
対象疾患	： 大腸癌				
1cycle（期間）	： 21日				
薬剤	： ペンブロリズマブ	200mg	day1	点滴静注	30分
■ レジメン名	： CAPOX+Bev　大腸（Apr併用）				
対象疾患	： 大腸癌				
1cycle（期間）	： 21日				
薬剤	： カペシタビン	2000mg/㎡/day	day1～14	経口	1日2回
	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	120分
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	点滴静注	30分 (初回90分) (2回目60分)
■ レジメン名	： FOLFIRI+Bev　大腸				
対象疾患	： 大腸癌				
1cycle（期間）	： 14日				
薬剤	： ベバシズマブ	5mg/kg	day1	点滴静注	30分 (初回90分) (2回目60分)
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	120分
	イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	13分
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2	点滴静注	45時間
■ レジメン名	： mFOLFOX6+Bev　大腸				
対象疾患	： 大腸癌				
1cycle（期間）	： 14日				
薬剤	： ベバシズマブ	5mg/kg	day1	点滴静注	30分 (初回90分) (2回目60分)
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	120分
	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	120分
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	13分
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2	点滴静注	45時間
■ レジメン名	： SOX（TS-1+L-OHP）＋Bev　大腸（Apr併用）				
対象疾患	： 大腸癌				
1cycle（期間）	： 21日				
薬剤	： ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	点滴静注	30分 (初回90分) (2回目60分)
	S-1	1.25㎡未満：40mg/回 1.25～1.5㎡：50mg/回 1.5㎡以上：60mg/回	day1-14	経口	1日2回
	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	120分
■ レジメン名	： IRI＋Bev　大腸				
対象疾患	： 大腸癌				
1cycle（期間）	： 14日				
薬剤	： ベバシズマブ	5mg/kg	day1	点滴静注	30分 (初回90分) (2回目60分)
	イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分
■ レジメン名	： IRIS（TS-1+後発CPT-11）＋Bev①②　大腸				
対象疾患	： 大腸癌				
1cycle（期間）	： 28日				
薬剤	： ベバシズマブ	5mg/kg	day1.15	点滴静注	30分 (初回90分) (2回目60分)
	S-1	1.25㎡未満：40mg/回 1.25～1.5㎡：50mg/回 1.5㎡以上：60mg/回	day1-14	経口	1日2回
	イリノテカン	125mg/㎡	day1.15	点滴静注	90分
■ レジメン名	： Bev＋IRIS（S-1+IRI）③週　大腸				
対象疾患	： 大腸癌				
1cycle（期間）	： 21日				
薬剤	： ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	点滴静注	30分 (初回90分) (2回目60分)
	S-1	1.25㎡未満：40mg/回 1.25～1.5㎡：50mg/回 1.5㎡以上：60mg/回	day1-14	経口	1日2回
	イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分
■ レジメン名	： Bev＋UFT/LV療法				
対象疾患	： 大腸癌				
1cycle（期間）	： 28日				
薬剤	： ベバシズマブ	5mg/kg	day1.15	点滴静注	30分 (初回90分) (2回目60分)
	UFT	300mg/㎡/day	day1～21	内服	1日3回
	ホリナート	75mg/body/day	day1～21	内服	1日3回
■ レジメン名	： Bev＋ロンサーフ療法				
対象疾患	： 大腸癌				
1cycle（期間）	： 28日				
薬剤	： ベバシズマブ	5mg/kg	day1.15	点滴静注	30分 (初回90分) (2回目60分)
	トリフルリジンチピラシル	35mg/㎡/day	day1～5、8～12	内服	1日2回

■ レジメン名 : BiweeklyCAPIRI＋Bev①(ﾎﾓ・複合ﾍﾃﾛ) 大腸

対象疾患	: 大腸癌				
1cycle（期間）	: 14日				
薬剤	: ベバシズマブ	10mg/kg	day1	点滴静注	30分 (初回90分) (2回目60分)
	カペシタビン	2000mg/㎡/day	day1～7	経口	1日2回
	イリノテカン	100mg/㎡	day1	点滴静注	90分

■ レジメン名 : BiweeklyCAPIRI＋Bev①(ﾎﾓ・複合ﾍﾃﾛを除く)大腸

対象疾患	: 大腸癌				
1cycle（期間）	: 14日				
薬剤	: ベバシズマブ	10mg/kg	day1	点滴静注	30分 (初回90分) (2回目60分)
	カペシタビン	2000mg/㎡/day	day1～7	経口	1日2回
	イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分

■ レジメン名 : Cape＋Bev療法

対象疾患	: 大腸癌				
1cycle（期間）	: 21日				
薬剤	: ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	点滴静注	30分 (初回90分) (2回目60分)
	カペシタビン	2000mg/㎡/day	day1～14	経口	1日2回

■ レジメン名 : CAPIRI＋Bev 大腸

対象疾患	: 大腸癌				
1cycle（期間）	: 21日				
薬剤	: ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	点滴静注	30分 (初回90分) (2回目60分)
	カペシタビン	1600mg/㎡/day	day1～14	経口	1日2回
	イリノテカン	200mg/㎡	day1	点滴静注	90分

■ レジメン名 : FOLFOXIRI＋Bev療法 大腸

対象疾患	: 大腸癌				
1cycle（期間）	: 14日				
薬剤	: ベバシズマブ	5mg/kg	day1	点滴静注	30分 (初回90分) (2回目60分)
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	120分
	イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	60分
	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	120分
	フルオロウラシル	3000mg/㎡	day1～2	点滴静注	45時間

■ レジメン名 : Infusional5-FU＋LVF+Bev 大腸

対象疾患	: 大腸癌				
1cycle（期間）	: 14日				
薬剤	: ベバシズマブ	5mg/kg	day1	点滴静注	30分 (初回90分) (2回目60分)
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	120分
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	13分
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2	点滴静注	45時間

■ レジメン名 : S-1＋Bev療法

対象疾患	: 大腸癌				
1cycle（期間）	: 42日				
薬剤	: ベバシズマブ	5mg/kg	day1.15.29	点滴静注	30分 (初回90分) (2回目60分)
	S-1	1.25㎡未満：40mg/回 1.25～1.5㎡：50mg/回 1.5㎡以上：60mg/回	day1～28	経口	1日2回

■ レジメン名 : アービタックス＋FOLFIRI療法 大腸

対象疾患	: 大腸癌				
1cycle（期間）	: 14日				
薬剤	: セツキシマブ	250mg/㎡ (初回400mg/㎡)	day1.8	点滴静注	120分
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	120分
	イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	10分
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2	点滴静注	45時間

■ レジメン名 : アービタックス＋mFOLFOX療法 大腸

対象疾患	: 大腸癌				
1cycle（期間）	: 14日				
薬剤	: セツキシマブ	250mg/㎡ (初回400mg/㎡)	day1.8	点滴静注	120分
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	120分
	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	120分
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	10分
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2	点滴静注	45時間

■ レジメン名 : アービタックス①～⑥+後発CPT-11①～④毎週投与法

対象疾患	: 大腸癌				
1cycle（期間）	: 42日				
薬剤	: セツキシマブ	250mg/㎡ (初回400mg/㎡)	day1.8.15.22.29.36	点滴静注	120分
	イリノテカン	100mg/㎡	day1.8.15.22	点滴静注	90分

■ レジメン名 : アービタックス①～⑦+後発CPT-11①～③2週間間隔

対象疾患	: 大腸癌				
1cycle（期間）	: 49日				
薬剤	: セツキシマブ	250mg/㎡ (初回400mg/㎡)	day1.8.15.22.29.36.43	点滴静注	120分
	イリノテカン	150mg/㎡	day1.15.29	点滴静注	90分

■ レジメン名　：　初回アービタックス単独①②③④　大腸
対象疾患　：　大腸癌
1cycle（期間）　：　28日

薬剤				
セツキシマブ	250mg/㎡ （初回400mg/㎡）	day1.8.15.22	点滴静注	120分

■ レジメン名　：　FOLFIRI+Bev高用量　大腸　（後発CPT-11）
対象疾患　：　大腸癌
1cycle（期間）　：　14日

薬剤				
ベバシズマブ	10mg/kg	day1	点滴静注	30分 （初回90分） （2回目60分）
レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	120分
イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分
フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	13分
フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2	点滴静注	45時間